

كنوز الخضراء

أسماك من البلاد التونسية


قرش مفترس / كلب بحر

الاسم العربي : قرش مفترس / كلب بحر
الاسم الفرنسي : Requin féroce
الاسم اللاتيني : Odontaspis ferox
الفصيلة : القرشيات (Odontaspididés)

معطيات عامة :

الطول : إلى حدود 3 أمتار.

نوع من الأسماك الغضروفية، يمكن مشاهدته بالبحر الأبيض المتوسط في عمق يتراوح بين 15 و420 مترا. يوجد بالخصوص في المياه الساحلية وعلى أطراف الجرف القاري. يتغذى من الأسماك الشوكية والقشريات والكلمار. نادر مياها.



قرش مفترس / كلب بحر

Requin féroce / Odontaspis ferox

حنشة / صنّور / حنقليس

الاسم العربي : حنقليس / حنشة / صنّور
الاسم الفرنسي : Anguille commune
الاسم اللاتيني : Anguilla anguilla
الفصيلة : الحنقليسيات (Anguillidés)

معطيات عامة :

الطول : 20 - 150 صم.

نوع من الأسماك العظمية التي اشتهرت خصوصا بهجرتها إلى سواحل المتوسط والأطلسي بعد أن تبيض في بحر السargas. توجد في بلادنا مختلف البحيرات (إشكل، بنزرت، تونس..)، وهي نادرة ببخرة الببيان. تلج أيضا المياه الجارية الشمالية وبعض السدود مثل سيدي سالم ويثر مشاركة وملاق وبوهرمة. تتميز الحنشة بشكل ممتد ونهاية فم مشقوفة حتى الحدة. تتغذى الفراخ في مرحلة أولى من البلاكتون الحيواني، وعندما تكرر قليلا، يصبح بإمكانها الاقنيات من الأسماك الصغيرة والقشريات والرخويات والضفادع ويرقات الحشرات. أفضل فترة للاستهلاك ببلادنا : ديسمبر – فيفري.


غراء كبيرة / قَطّوس البحر الكبير

الاسم العربي : غراء كبيرة / قَطّوس البحر الكبير
الاسم الفرنسي : Grande roussette
الاسم اللاتيني : Scyliorhinus stellaris
الفصيلة : الغرّائيات (Scyliorhinidés)

معطيات عامة :

الطول : إلى حدود 70 صم.

نوع من الأسماك الغضروفية، يمكن مشاهدته بالبحر الأبيض المتوسط في عمق يمكن أن يبلغ 550 مترا. يوجد بصفة ملحوظة في مياه الجرف القاري في عمق يتراوح بين 50 و150 مترا. ذو تغذية متنوّعة : رخويات، ديدان، قمبري، سرطانات، أسماك صغيرة.. لا يعتبر خطير بالنسبة للإنسان، وهو أقل وجودا مياها مقارنة بالغراء الصغيرة.



غراء كبيرة / قَطّوس البحر الكبير

Grande roussette / Scyliorhinus stellaris

ورنك / ريّة / حمامة

الاسم العربي : ورنك / ريّة / حمامة
الاسم الفرنسي : Raie bouclée
الاسم اللاتيني : Raja clavata
الفصيلة : اليليائيات (Rajidés)

معطيات عامة :

الطول : إلى حدود 50 صم.

نوع من الأسماك الغضروفية، يمكن مشاهدته بالبحر الأبيض المتوسط في القيعان الرملية الموحلة – والمعشبات حتى عمق 200 مترا. شائع جدًا على طول السواحل التونسية. يتغذى من القشريات والأسماك والرخويات.



ورنك / ريّة / حمامة

Raie bouclée / Raja clavata

تنّ أحمر

الاسم العربي : تنّ أحمر
الاسم الفرنسي : Thon rouge
الاسم اللاتيني : Thunnus thynnus
الفصيلة : الإسقمريات (Scombridés)

معطيات عامة :

الطول : 50 – 150 صم، ويمكن أن يبلغ 300 صم.

نوع من الأسماك العظمية، يعيش بالبحر الأبيض المتوسط. سمك أزرق عائم مهاجر، يعيش في قطعان كبيرة العدد. يقطع خلال هجرته مسافات طويلة تبلغ عدّة آلاف من الكيلومترات. يوجد بكامل السواحل التونسية. يتميز بجسم قويّ مغزليّ. حيوان بحري خاتل وشديد الشراهة، إذ يلتهم يوميا كميات كبيرة من الأسماك والقشريات ورأسيات الأرجل كالأخطبوط والكلمار. أفضل فترة للاستهلاك : جوان – أوت.



تنّ أحمر

Thon rouge / Thunnus thynnus


دنديق / قطوس

الاسم العربي : دنديق / قَطّوس
الاسم الفرنسي : Denté
الاسم اللاتيني : Dentex dentex
الفصيلة : الإسبوريات (Sparidés)

معطيات عامة :

الطول : 20 – 50 صم، ويمكن أن يبلغ 70 صم.

نوع من الأسماك العظمية، يعيش بالبحر الأبيض المتوسط في القيعان الصخرية ومعشبات البوسيدونيا في عمق يمكن أن يبلغ 150 مترا. شائع مياها من الشمال إلى الجنوب. يتميز بجسم قويّ بيضوي. يتغذى من الأسماك والرخويات (رأسيات الأرجل). أفضل فترة للاستهلاك : جوان – جويلية.



دنديق / قَطّوس

Denté / Dentex dentex


وقّاس

الاسم العربي : وقّاس
الاسم الفرنسي : Ange de mer
الاسم اللاتيني : Squatina squatina
الفصيلة : ملاكيات البحر (Squatiniidés)

معطيات عامة :

الطول : إلى حدود 150 صم.

نوع من الأسماك الغضروفية، يمكن مشاهدته بالبحر الأبيض المتوسط في القيعان الرملية والموحلة حيث يختفي عادة تحت الرمل أو الوحل، كما يمكنه أيضا اسباحة بكل يسر فوق القاع. يوجد على طول السواحل التونسية ويتميّز بجسم مقلطح جدًا وعريض جدًا. ينشط خلال الليل أكثر منه نهارا. يتغذى من الأسماك المفلطحة والقشريات والرخويات. سمكة عادة مسالمة، إلا أنها يمكن أن تصبح عدائية عندما يتم مهاجمتها أو جرحها أو صيدها. أفضل فترة للاستهلاك ببلادنا : طوال السنة.



وقّاس

Ange de mer / Squatina squatina


عنز الماء

الاسم العربي : عنز الماء
الاسم الفرنسي : Baliste
الاسم اللاتيني : Balistes carolinensis
الفصيلة : العنزيّات البحرية (Balistidés)

معطيات عامة :

الطول : إلى حدود 45 صم.

نوع من الأسماك العظمية، يمكن مشاهدته بالبحر الأبيض المتوسط في القيعان الصخرية في عمق يتراوح بين 10 و100 مترا. في بلادنا، تلازم هذه السمكة عادة السواحل الشمالية والجنوبية. تتميّز بجسم عال ومضغوط على الجوانب ومغطى بحراشف صغيرة وسميكة. اللون رمادي ذو انعكاس بنيّ مع وجود بقع أو شرائط عرضية على الجانبين. تتغذى من الرخويات والقشريات.



عنز الماء

Baliste / Balistes carolinensis


ورقة / وراطة

الاسم العربي : ورقة / وراطة
الاسم الفرنسي : Daurade / Dorade
الاسم اللاتيني : Sparus aurata
الفصيلة : الإسبوريات (Sparidés)

معطيات عامة :

الطول : 20 – 50 صم، ويمكن أن يبلغ 70 صم.

نوع من الأسماك العظمية، يعيش بالبحر الأبيض المتوسط. يوجد بالسواحل في القيعان الرملية ومعشبات البوسيدونيا. يعيش منفردا أو في قطعان صغيرة العدد. شائع بالسواحل التونسية وبلغ كذلك البحيرات الشاطئية. يتميّز بجسم بيضوي ومضغوط على الجانبين. يتغذى من الرخويات خصوصا اصداف بلح البحر التي تطحنها بكل سهولة، وكذلك من القشريات والأسماك. تقات بصفة ثانوية من الأعشاب والطحالب البحرية. أفضل فترة للاستهلاك : ديسمبر – فيفري. نظرا لقيمتها التجارية المرتفعة، تربي الورقة بصفة اصطناعية قبل تسويقها داخل البلاد وخارجها.



ورقة / وراطة

Daurade / Dorade / Sparus aurata

كنوز الخضراء

